Etude de Biomolécules Actives (Antibiotiques) Produites par Les Actinobactéries Halophiles Rares du Genre *Nocardopsis* Isolées des Sols Sahariens Algériens

F. Boudjelal¹, A. Zitouni¹

¹Laboratoire de Biologie des Systèmes Microbiens (LBSM), Ecole Normale Supérieure de Kouba (ENS).

Résumé : La prévalence de la multirésistance aux composés antimicrobiens chez les agents pathogènes augmente à un rythme alarmant à travers le monde. Une des stratégies face à ce problème est la recherche de nouvelles espèces ayant un potentiel biotechnologique intéressant à savoir la production de nouvelles molécules antibiotiques. La recherche de nouvelles espèces d'actinobactéries constitue une composante essentielle à la découverte de médicaments à base de produits naturels et à large spectre d'activité biologique, tels que les antibiotiques antibactériens, antifongiques et les substances toxiques, cytotoxiques, antivirales et anticancéreuses. Notre étude consiste à la production, extraction et purification d'une biomolécule active produite par une actinobactérie halophile rare du genre *Nocardopsis*.

Mots-clés: Actinobactéries rares halophiles, *Nocardopsis*, Biomolécules actives (antibiotiques), production, Purification.

I- Introduction :

Les sols salins du Sahara Algérien constituent un champ investigation très étendue et leur exploration a montré la présence d'actinobactéries halophiles rares du genre *Nocardopsis*, qui occupent une place importante en raison de leur capacité à produire de nouveaux métabolites. Ils représentent une source potentielle de molécules actives nouvelles (antibiotiques, enzymes etc.), qui peuvent être utilisées dans les domaines médical et pharmaceutiques.

II- Matériels et méthodes:

Le pouvoir antimicrobien des isolats de *Nocardopsis* des sols sahariens a été mis en évidence par la méthode des disques d'agar contre des germes-cibles pathogènes pour l'homme. Une production par fermentation a été réalisée suivie de d'extraction et purification selon la planche suivante:

III- Résultats et discussion: L'étude de l'antagonisme des isolats d'actinobactéries halophiles contre six germes pathogènes pour l'homme a montré une activité antibactérienne qui est dirigée essentiellement contre les bactéries à Gram négatif pour les cinq isolats et une activité antifongique pour deux isolats.

Tableau 1: Antagonisme des isolats contre divers microorganismes pathogènes

Germes cibles	Isolats de <i>Nocardopsis</i> halophiles				
	AH 26	AH46	AH15	AH12	AH24
<i>Staphylococcus aureus</i>	20	11	-	-	12
<i>Salmonella enterica</i>	20	12	20	21	25
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	30	30	-	-	30
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	-	14	15	-	-
<i>Escherichia coli</i>	-	-	-	40	-
<i>Candida albicans</i>	10	-	-	-	30

Tableau 2: Résultat de tests d'activités des extraits

Germes cibles	Diamètres des zones d'inhibitions en (mm)	
	EAS	EMC
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	30	20
<i>Staphylococcus aureus</i>	22	10
<i>Candida albicans</i>	20	-

EAS: Extrait d'acetate d'ethyl du surnageant de culture, EMC: Extrait méthanolique des cellules

Figure 1: Cinétique de croissance et de production de biomolécules actives par un isolat de *Nocardopsis*.

Figure 2: Biotaugraphie et profil d'éluion HPLC de la fraction active

Figure 3: Spectre infra rouge de la fraction ATB

Conclusion: Les isolats de *Nocardopsis* étudiés ont montré une activité antibactérienne qui est dirigée essentiellement contre les bactéries à Gram négatif. Un isolat a été sélectionné pour une étude approfondie. Après purification une fraction active de couleur jaunâtre a été obtenue, soluble dans du méthanol à activité antibactérienne et antifongique avec RF 0,75, caractériser par la présence des groupements Alcool (O-H), Alkynes (=C-H), Aldehyde (CH), Éthers (C-O-C), (-N=N). Les fortes activités sont obtenues contre *Salmonella enterica* et *Pseudomonas aeruginosa*, cette dernière est répertoriée dans le groupe prioritaire I de l'OMS des agents pathogènes nécessitant de nouvelles options de traitement de manière urgente.